

核准日期：2007年11月06日

修改日期：2010年01月21日

修改日期：2013年12月01日

修改日期：2015年12月01日

氟胞嘧啶片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：氟胞嘧啶片


英文名称：Flucytosine Tablets

汉语拼音：Fubaomiding Pian

【成份】本品主要成份为氟胞嘧啶。

化学名称：5-氟-4-氨基-2(1H)-嘧啶酮。

化学结构式：



分子式：C₄H₄FN₃O

分子量：129.09

【性状】本品为白色或类白色片。

【适应症】适用于念珠菌属及隐球菌属所致的感染。

【规格】0.25g

【用法用量】口服。一次1.0-1.5g(4-6片)，一日4次。或遵医嘱。

【不良反应】

可有恶心呕吐，厌食，腹泻，皮疹，发热，贫血，氨基转移酶升高，细胞及血小板减少等不良反应。

可见血细胞及血小板减少，偶见肝坏死、全血细胞减少、骨髓抑制和再生障碍性贫血。

【禁忌】

1. 肾功能不全者禁用。
2. 严重肝病患者禁用。
3. 对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 用药期间应定期检查血象。
2. 血液病患者，肝功能减退者慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇慎用。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】

1. 与两性霉素B合用，有明显的协同作用。后者亦增加本品毒性。
2. 同用骨髓抑制药可加重毒性反应，尤其是造血系统的不良反应。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】

本品能被真菌代谢成氟尿嘧啶，进入其脱氧核糖核酸，影响真菌核酸和蛋白质的合成。本品对真菌有选择性的毒性作用，在人体细胞内并不能大量地将氟胞嘧啶转换为氟尿嘧啶。

【药代动力学】

本品自胃肠道吸收迅速而完全，口服2g后2-4小时血药浓度达峰值，为30-40mg/L。半衰期(t_{1/2})为2.5-6小时。在血液中与血浆蛋白结合率约50%，广泛分布于全身主要脏器中，易通过血-脑脊液屏障，脑脊液药物浓度为血药浓度的65%-90%。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】

1. 玻璃瓶或塑料瓶装。(1) 每瓶100片。(2) 每瓶36片。
2. 铝塑包装。每板10片，每盒2板。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2015年版二部

【批准文号】国药准字H32026330

【生产企业】

企业名称：精华制药集团股份有限公司

生产地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：0513-85609111 0513-85609126

传真号码：0513-85609115

网 址：www.ntjhz.com